

زردی



زردی جز بیماری های شایع نوزادی است در ۶۰٪ الی ۸۰٪ نوزادان مشاهده می گردد در درصد بالایی از نوزادان زرد علت زردی فیزیولوژیک می باشد که اقدام خاصی لازم ندارد اما در موارد غیر از آن به علت رسوب زردی (بیلی روبین) در سلول های مغز خطرانی را در بر دارد. لذا برای پیشگیری از آن نکات زیر ضروری است:

زردی هایی که اقدامات درمانی لازم دارند:

ظهور زردی در روز اول تولد

بالا بودن زردی (بیلی روبین) بیشتر از ۱۳ در نوزاد رسیده و بیشتر ۱۰ در نوزاد نارس

زردی که بیشتر از دو یا سه هفته طول بکشد

زردی همراه با علائم خوب شیر نخوردن - رنگ پریدگی - بی حالی - بی قراری و گریه شدید باشد

مواردی که در آنها احتمال زردی بیشتر است

ناسازگاری گروه های (مادر منفی و نوزاد مثبت باشد و یا مادر O و نوزاد A یا B باشد)

وجود خون مردگی در سر و کبودی پوست

سابقه بستری در نوزاد که منجر به بستری شده اشد

وجود زردی روز اول تولد

نارس بودن و وزن کم نوزاد

سن مادر بالای ۲۵ سال

نوزاد پسر

کم دادن شیر به نوزاد

داشتن دیابت مادر در دوران بارداری