


چه زمانی فوراً به اورژانس مراجعه کنیم؟



شکم بسیار سفت،
دردناک یا درد شدید
و منتشر در کل شکم



استفراغ مکرر و
ناتوانی در نگه داشتن
مایعات



تب و لرز همراه با
شکم درد



ضعف و بیحالی یا
غش کردن



در بیشتر موارد، درمان اصلی
آپاندیسیت جراحی است
تا از پارگی آن و گسترش عفونت
در شکم جلوگیری شود.



آپاندیسیت چه علائمی دارد؟



درد شکم که اغلب از اطراف
ناف شروع می‌شود و به
سمت راست و پایین شکم
می‌رود



بی اشتها و
عدم تمایل به غذا
خوردن



تهوع، استفراغ
و احساس سنگینی
در شکم




تب و احساس گرما که
میتواند همراه با لرز
باشد



در بعضی از افراد ممکن است
علائم غیر معمول باشد
خصوصاً در سالمندان، کودکان و
افراد باردار

آپاندیسیت یا التهاب آپاندیس

آپاندیس یک زائده کوچک لوله‌ای شکل است که
به ابتدای روده بزرگ (سمت راست پایین شکم)
وصل است.



گاهی آپاندیس ملتهب و عفونی می‌شود که به آن
آپاندیسیت می‌گویند. آپاندیسیت معمولاً نیاز به
درمان فوری دارد ممکن است پاره شود و
عفونت در شکم پخش شود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کردستان


- بیمارستان بوعلی مریوان
- تهیه و تنظیم: مهران راشدی خرداد ماه ۱۴۰۵

مراقبت های بعد از عمل جراحی




داروها را منظم و طبق توصیه پزشک مصرف کنید

مایعات کافی بنوشید و غذا را با حجم کم و رژیم نرم شروع کنید



محل زخم را تمیز و خشک نگه دارید و طبق توصیه پزشک شستشو و پانسمان انجام دهید

راه رفتن سبک را شروع کنید و ۴ تا ۶ هفته فعالیت سنگین انجام ندهید



در صورت تب، درد شدید، قرمزی ترشح و خونریزی زخم، تهوع و استفراغ شدید و تنگی نفس فوراً مراجعه کنید

مراقبت های قبل از عمل جراحی



طبق دستور پزشک، قبل از عمل ناشتا باشید



داروهای مصرفی خود را اطلاع دهید مخصوصاً داروهای رقیق کنند خون



آزمایش ها و بررسی های لازم را انجام دهید



زیورآلات و وسایل فلزی را خارج کنید و ناحیه عمل جراحی را تمیز کنید



در صورت احتمال بارداری، حساسیت یا مصرف داروهای خاص، پزشک را مطلع کنید


جراحی آپاندکتومی

آپاندکتومی یعنی برداشتن آپاندیس با عمل جراحی که به دو روش انجام می شود



جراحی باز:

با یک برش بزرگتر، در موارد خاص یا پیچیده



جراحی بسته یا لاپاراسکوپی :

با چند برش کوچک، درد کمتر و بهبود سریع تر

درمان قطعی آپاندیسیت معمولاً جراحی (آپاندکتومی) است. در این عمل، آپاندیس ملتهب برداشته می شود تا از پارگی آپاندیس و انتشار عفونت در شکم جلوگیری شود

پزشک با توجه به شرایط بیمار، مناسب ترین روش را انتخاب می کند.

