


علائم حمله صرعی

حملات صرع ممکن است به شکل‌های مختلف دیده شوند:



خیره شدن ناگهانی و قطع ارتباط با اطراف



سفت شدن بدن



لرزش یا تکان دست و پا و حرکات حرکان غیر ارادی در صورت و اندام‌ها



افتادن ناگهانی



گیجی یا خواب آلودگی معمولاً بعد از حمله صرع



مدت حمله معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه است و پس از آن کودک ممکن است مدتی گیج یا خسته باشد



صرع چیست ؟

صرع یک بیماری مغزی است که باعث بروز حملات تشنجی تکرارشونده می‌شود و به علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی در مغز ایجاد می‌شود.



علت‌های احتمالی

عوامل ژنتیکی	
مشکلات هنگام تولد مانند کمبود اکسیژن	
ناهنجاری‌های مغزی	
عفونت‌های مغز مثل مننژیت و آنسفالیت	
ضربه شدید به سر	



بیماری صرع در کودکان



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

• بیمارستان بوعلی میروان

• تهیه و تنظیم: مهران راشدی خرداد ماه ۱۴۰۵

درمان صرع

هدف درمان صرع، کنترل حملات و کمک به زندگی طبیعی کودک است روش های درمانی شامل :



دارو درمانی

• دارو طبق دستور پزشک و منظم استفاده شود و خود سرانه آن را کم و زیاد نکنید

• مربی و معلم کودک را از بیماری با خبر کنید

• بیمار خواب و استراحت کافی داشته باشد و از استرس دور باشد



رژیم غذایی
کنترل

• رژیم غذایی پر چربی، کم قند و با پروتئین کنترل شده

• فقط با دستور پزشک و متخصص تغذیه تجویز می شود

• والدین نباید خودسرانه آن را قطع یا شروع کنند



در موارد خاص و مقاوم به درمان جراحی



روش های تحریک عصبی در برخی موارد

چه زمانی فوراً مراجعه کنیم ؟

زمانی که تشنج بیشتر از 5 دقیقه طول بکشد



حملات پشت سر هم تکرار شوند



کودک پس از تشنج هشیاری خود را به دست نیاورد



کودک کبود شود یا تنفس کودک مشکل دار باشد



اولین حمله تشنجی کودک باشد



حمله در آب یا استخر رخ دهد



❖ در بعضی موارد علت دقیق بیماری نا مشخص است.

❖ تشنج ناشی از تب در کودکان خردسال معمولاً صرع محسوب نمی شود.

هنگام حملات صرع چه کنیم؟

کنترل آرامش در والدین یکی از مهمترین نکات در مدیریت حمله صرع می باشد



کودک را به آرامی به پهلو بخواهانید



وسایل خطرناک اطراف را دور کنید



چیزی داخل دهان کودک نگذارید و حرکات را به زور متوقف نکنید



زمان شروع و پایان تشنج را به خاطر داشته باشید



لباس های تنگ کودک را شل کنید

