

روش های تشخیص

تشخیص دقیق کمک می کند پزشک بهترین روش درمان را انتخاب کند و از بروز عوارضی مثل عفونت یا انسداد مجاری صفراوی جلوگیری شود.

بیشتر روش های تشخیصی، ساده، سریع و بدون درد هستند و کمک می کنند منبع اصلی درد و مشکلات شما مشخص شوند.



سونوگرافی



آزمایش خون



سی تی اسکن



ام آر آی



معاینه فیزیکی



اسکن هسته ای
یا هیپاتوبیلیاری

✓ پزشک ممکن است برای تشخیص قطعی، از یک یا چند روش فوق استفاده نماید

التهاب کیسه صفرا یا کله سیستیت

کیسه صفرا یک عضو کوچک در زیر کبد است که به هضم چربی کمک می کند.

شایع ترین علت التهاب کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا است که مسیر خروج صفرا را می بندد

علائم شایع التهاب کیسه صفرا



درد در قسمت راست و بالای شکم که به شانه راست و پشت هم انتشار دارد و بعد از خوردن غذای چرب بیشتر است


تهوع و استفراغ




نفخ و بی اشتها



گاهی زردی پوست یا چشم



تب یا لرز



جراحی کیسه صفرا راهنمای بیمار



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کردستان

• بیمارستان بوعلی مریوان

• تهیه و تنظیم: مهران راشدی خرداد ماه ۱۴۰۵

مراقبت های بعد از عمل




داروها را منظم و طبق توصیه پزشک مصرف کنید.

شروع تدریجی مایعات و غذاهای نرم با حجم کم.



پرهیز از رژیم غذایی پر چرب تا چند هفته بعد عمل.



محل زخم را تمیز و خشک نگه دارید و طبق توصیه پزشک شستشو و پانسمان انجام دهید.

راه رفتن سبک را شروع کنید و ۴ تا ۶ هفته فعالیت سنگین انجام ندهید.



مراقبت های قبل از عمل



طبق دستور پزشک، قبل از عمل ناشتا باشید



داروهای مصرفی خود را اطلاع دهید مخصوصا داروهای رقیق کنند خون



آزمایش ها و بررسی های لازم را انجام دهید و به همراه داشته باشید



زیورآلات و وسایل فلزی را خارج کنید و ناحیه عمل جراحی را تمیز کنید



در صورت احتمال بارداری، حساسیت یا مصرف داروهای خاص، پزشک را مطلع کنید. و با پزشک بیهوشی نیز مشورت کنید

روش های درمان

درمان ممکن است با دارو و مراقبت شروع شود، اما در بسیاری از بیماران، به خصوص در موارد تکرارشونده یا شدید، جراحی برداشتن کیسه صفرا توصیه می شود




دارو درمانی و استراحت در مراحل اولیه و موارد التهابی

روش جراحی در مراحل شدیدتر و عود شونده



روش های جراحی



لاپاراسکوپی یا بسته




جراحی باز

✓ جراحی لاپاراسکوپی شایعترین و کم تهاجم ترین روش جراحی می باشد



بعد از برداشتن کیسه صفرا با رعایت توصیه های پزشک، بدن میتواند همچنان فعالیت طبیعی خود را داشته باشد



در صورت تب، درد شدید، قرمزی ترشح و خونریزی زخم، تهوع و استفراغ شدید، تنگی نفس و زردی فوراً مراجعه کنید